

ОПІКИ

```
graph TD; A[ОПІКИ] --> B[термічні]; A --> C[хімічні]; A --> D[променеві]; A --> E[радіаційні]; B --> B1[виникають під дією високих температур, кип'ятку, гарячої пари, розпечених предметів]; C --> C1[виникають під дією їдких хімічних речовин: кислот, лугів, концентрованих солей]; D --> D1[виникають під час дії інтенсивного інфрачервоного, ультрафіолетового випромінювання]; E --> E1[виникають під час контакту з радіоактивними речовинами];
```

термічні

виникають під дією високих температур, кип'ятку, гарячої пари, розпечених предметів

хімічні


виникають під дією їдких хімічних речовин: кислот, лугів, концентрованих солей

променеві

виникають під час дії інтенсивного інфрачервоного, ультрафіолетового випромінювання

радіаційні

виникають під час контакту з радіоактивними речовинами

The background of the slide features a close-up, soft-focus photograph of pink orchid flowers. The petals are a delicate shade of pink, with some showing subtle white variegation. The lighting is bright and natural, creating a gentle, ethereal atmosphere. The text is overlaid on a semi-transparent pink rectangular box that spans the middle of the image.

Перша допомога при термічних опіках

Термічні опіки – виникають під дією високих температур, кип'ятку, гарячої пари, розпечених предметів.




Опіки поділяються на чотири ступені:

- 1 ступінь –почервоніння і набряк шкіри, біль у місці опіку;
- 2 ступінь – поява пухирів в обпечених місцях;
- 3 ступінь - омертвіння поверхневих і глибоких шарів шкіри, пухирі з кров'яною рідиною
- 4 ступінь – обвуглювання шкіри, поразка м'язів, сухожиль, кісток.

Схема надання першої допомоги:

- зупиніть дію високої температури: загасить одяг, що зайнявся, за допомогою ковдри, води;
- зніміть обгорілий одяг або розріжте його (не відривати шматочків одягу, що пристали до місця опіку!);
- при можливості, зніміть металеві предмети (кілцьця, браслети, часи);
- при обмеженій поверхні опіку I-II ступеню охолоджуйте місце опіку чистою холодною водою протягом 10-15 хв.



- 
- A background image of several pink orchid flowers with yellow centers, slightly out of focus.
- - накладіть стерильну (при відсутності – чисту) серветку (якщо частки одягу пристали до місця опіку – пов'язку накладають на них);
 - - заспокойте постраждалого, не давати йому рухатись;
 - - укрийте потерпілого теплою ковдрою, одягом;
 - - постійно давайте потерпілому багато теплого пиття (чай, воду, розчин: 1 ч.л. поварської солі та ½ ч.л. соди на літр води);




- - дайте знеболювальне (1-2 таблетки анальгіну);
- - при великій поверхній опіку загорніть потерпілого в чисте простирадло, укрийте;
- - викличте швидку допомогу.



Чого не можна робити?

- Змащувати маслом, кремом, маззю, білком і т.п., наносити піну ("Пантенол") на щойно обпечене місце.
- Відривати прилиплу одяг.
- Проколювати бульбашки.
- Мочитися (писати) на опік.





МІСЦЕВЕ ЛІКУВАННЯ

МІСЦЕВЕ ЛІКУВАННЯ ЗВИЧАЙНО РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ЗРАЗУ ПІСЛЯ НАДХОДЖЕННЯ ПОТЕРПІЛИХ У ЛІКУВАЛЬНИЙ ЗАКЛАД, А ТИМ, ХТО ПЕРЕБУВАЄ В СТАНІ ШОКУ ЧИ У РАЗІ ЗАГРОЗИ ЦЬОГО УСКЛАДНЕННЯ, — ПІСЛЯ ВИВЕДЕННЯ ЇХ З ЦИХ СТАНІВ.

ПРИ ОПІКУ І СТУПЕНЯ УРАЖЕНУ ПОВЕРХНЮ ЗМАЗУЮТЬ ЕТИЛОВИМ СПИРТОМ (56—76 %) І ПОВ'ЯЗКОЮ ЇЇ НЕ ЗАКРИВАЮТЬ. ЧЕРЕЗ 3—5 ДІБ НЕКРОТИЗОВАНИЙ ПОВЕРХНЕВИЙ ЕПІТЕЛІЙ ЗЛУЩУЄТЬСЯ, ЗАМІНЮЮЧИСЬ НА НОВИЙ, ЩО МАЄ РОЖЕВИЙ КОЛІР У РАННІ СТРОКИ.

Опіки II ступеня обробляють після знеболювання (внутрішньовенне вводять аналгетики). Шкіру біля обпеченої поверхні дезінфікують 0,5 % розчином хлоргексидину, 1 % йодонатом чи 76 % етиловим спиртом.



етиловий спирт



йодонат





© ОАО "Тернофарм" 2006



розчин хлоргексидин

ОПІКИ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ



A background image of several pink orchid flowers in bloom, with soft, delicate petals and visible stamens. The flowers are arranged in a cluster, with some in sharp focus and others blurred in the background, creating a sense of depth. The lighting is soft and natural, highlighting the texture of the petals.

Діагностика ґрунтується на таких клінічних ознаках та симптомах:

- 1) наявність опіків голови та шиї;
- 2) спалене волосся в носі;
- 3) охриплість голосу;
- 4) задишка та ціаноз;
- 5) "трубний" кашель;
- 6) стискаючий біль вздовж груднини;
- 7) запалення ротоглотки;
- 8) виділення харкотиння з домішками сажі, кіптяви.