

Актуальні питання ІТ в зоні АТО



Зброя АТО

Значне зростання тяжкості пошкоджень спостерігається внаслідок удосконалення балістичних характеристик снарядів, збільшення їх кінетичної енергії та ролі кавітаційного і ударно-хвильового пошкоджуючих механізмів.



РПГ-18 «Муха»



Т-64 «Булат»



120-мм полковий міномет



БМ-21 «Град»



Зброя АТО

Окрім того, відмічається збільшення частки поєднаних і множинних поранень. За останніми даними, при бойовій вогнепальній травмі частота поєднаних поранень перевищує 40%.




Гаубиця Д-30 калібр 122 мм



Су-25 «Шпак»



СХЕМА ЛІКУВАЛЬНО-ЕВАКУАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АТО



1,5 - 6 год. до 12 год.

≈ 11,3 годин

Догоспітальна
допомога

Госпітальна допомога





Сучасна концепція багатоетапного лікування




Рисунок1.jpg

- УМОВНІ ПОЗНАЧКИ
- ГВМКЦ, військово-медичні клінічні центри (регіонів)
- військові мобільні госпіталі
- центр реабілітації
- медичні заклади МОУ
- шлях евакуації автомобільним транспортом
- шлях евакуації залізничним транспортом
- шлях евакуації повітряним транспортом



Базові принципи сучасної системи лікувальних заходів під час евакуації в умовах проведення ДТПO полягають у наступному:

- надання невідкладної медичної допомоги постраждалим і хворим та ранній початок проведення інтенсивної терапії;
- забезпечення інтенсивної терапії тяжкопораненим і тяжкохворим під час евакуації;
- евакуація постраждалих і хворих до лікувального закладу для надання хірургічної та анестезіологічної допомоги в повному об'ємі з наступним лікуванням і реабілітацією.



ВИДИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В АТО

| Догоспітальний етап | | Госпітальний етап | | | |
|------------------------|---|--|---|---------------------------|-------------------------------------|
| Рота Батальйон | Бригада | Мобільний госпіталь, районні та міські лікарні МОЗ | ВКМЦ, ВГ багато- профільні лікарні МОЗ | ГВКМЦ ВМКЦ, НДІ МОЗ | ГВКМЦ Центри реабілітаці ї |
| | | | | | |
| Перша медична допомога | Перша лікарська допомога | Кваліфікована хірургічна допомога | | | Реабілітація |
| Долікарська допомога | Спеціалізована хірургічна допомога, Спеціалізоване лікування | | | | |

| Догоспітальний | Госпітальний |
|----------------|--------------|
|----------------|--------------|

РІВНІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗА СТАНДАРТАМИ НАТО

| | | | | | |
|---|---|----|----------------|-------|---|
| O | I | II | II, III, IV | IV, V | V |
|---|---|----|----------------|-------|---|

Під час медичного забезпечення АТО в Збройних силах України були створені і використані мобільні хірургічно-анестезіологічні групи (МХАГ), до складу якої увійшли:

- 2 лікарі-хірурги;
- лікар-анестезіолог ;
- дві медичні сестри.

Вони мають на оснащенні мобільні автоперев'язочні (АП-2).

Евакуації поранених здійснювалась автомобільним чи авіаційним транспортом до мобільного госпіталю або міської (районної) лікарні.



ЗАСОБИ НАЗЕМНОЇ АВІОПІРАНСПОРТНОЇ ЕВАКУАЦІЇ



Авіаційно-транспортний підрозділ



PICT8116_1




Перевезення до Харкова і Дніпропетровська відбувається переважно гвинтокрилами. Для надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги поранені санітарною авіацією (літак “Vita” – основне повітряне судно, яке використовується, – операційно-реанімаційний літак АН-26) транспортуються в інші чотири ВМКЦ, які розташовані у Києві, Вінниці, Одесі, Львові . Окрім них, є ще 14 військових госпіталів у Миколаєві, Житомирі, Чернівцях, Рівному, Білій Церкві, Чернігові та інших містах України, де може здійснюватися реабілітація поранених.





Тактика при кровотечении



На поле боя

1. Используйте жгут для остановки наружного кровотечения и при травматической ампутации.
2. В качестве дополнения к жгуту используйте местные кровоостанавливающие средства.
3. Внутривенный доступ 18F. При невозможности в/в, используйте внутрикостную инфузию.
4. Транексамовая кислота, если у пострадавшего ожидается массивная кровопотеря: 1 гр транексамовой кислоты в 100 мл физиологического раствора или лактата Рингера как можно скорее, но не позднее, чем через 3 часа после травмы. Второе введение 1 гр после ГЭК (Hexextend) или другой жидкости.
5. Жидкостная реанимация.



Тактика при кровотоении



На поле боя


5. Жидкостная реанимация.

- Оценка геморрагического шока: изменения психического состояния (при отсутствии травмы головы) и слабый или отсутствующий периферический пульс - лучшие «полевые» показатели шока.
- Если не в шоке: в/в жидкость не нужна; допускается пероральная жидкость, если в сознании и может глотать.
- Если в шоке: Nextend (6% ГЭК) 500 мл в/в болюсно; повторить один раз через 30 минут, если все еще в шоке, но не больше, чем 1000 мл Nextend, что эквивалентно 6000 мл рингера-лактата.
- Если пострадавший с ЧМТ находится в бессознательном состоянии и не имеет периферического пульса, проводить жидкостную реанимацию до восстановления пульса.

6. Профилактика гипотермии.



Тактика при кровотоении



Эвакуация (в дополнение к предыдущим пунктам)

- Поддерживать целевой уровень систолического АД 80-90 мм рт., если возможно измерение.
- Продолжать реанимацию с Nextend или кристаллоидами по мере необходимости для поддержания целевого АД или клинической стабильности.
- Если доступны продукты крови, использовать в соответствии с утвержденным протоколом:
- 2 единицы плазмы + эритроциты в соотношении 1: 1.
- Если компоненты крови не доступны, рассмотреть переливание свежей цельной крови.
- Если пострадавший с подозрением ЧМТ – поддерживать ощутимый периферический пульс или целевой уровень систолического АД, по крайней мере 90 мм рт.ст.

АНАЛГЕЗІЯ НА ПОЛІ БОЮ

(ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE)

[HTTP://WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/PUBMED/24604434](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24604434)

- (1) meloxicam and Tylenol in the TCCC Combat Pill Pack – при незначних болях; - Tylenol - 650 мг Мелоксикам - 15 мг всередину один раз на день
- 2) пероральний трансмукозний фентаніл - при помірних та сильних болях, але при відсутності геморагічного шоку та порушенні дихання; - Фентанілу цитрат 800 мкг
- 3) кетамін – помірні та сильні болі за наявності геморагічного шоку або порушенні дихання або наявності ризику розвитку інших ускладнень
 - ✘ - Кетамін 50 мг внутрішньом'язово, або ж у
 - ✘ - Кетамін 20 мг повільно внутрішньовенно
 - Налоксон (0,4 мг внутрішньовенно або внутрішньом'язово)

Примітка:

- ✘ морфін може бути альтернативою фентанілу якщо є можливість внутрішньовенного введення.
- ✘ наявність налоксону обов'язкова при використанні опіоїдів
- ✘ прометазин використовується при блюванні та тошноті.

Выводы

- **Аналгезия на поле боя и при транспортировке бойцов должна рассматриваться как приоритетная задача!!!**
- Устранение боли на поле боя и траспортировке осуществляется преимущественно НАЛБУФИНОМ.
- **Рассмотреть альтернативы налубуфину (МОРФИН, ФЕНТАНИЛ и др. в разных формах).**
- Нужно рассмотреть использование безопасных анальгетиков (ПАРАЦЕТАМОЛ, МЕЛОКСИКАМ) для рутинного использования бойцами на догоспитальном этапе и комплектование ими аптечек индивидуальных.
- **КЕТАМИН высокоэффективный и безопасный анальгетик даже при сильной боли при различных путях введения**

“Триада смерти” при политравме



В 1980-х, гипотермия, ацидоз и коагулопатия были описаны как «триада смерти при политравме» или порочный круг при политравме — основные звенья патогенеза при политравме.

DAMAGE CONTROL RESUSCITATION



130_3053

*Использование стратегии **Damage control resuscitation** позволило снизить летальность после политравмы среди гражданского населения*

- *в 1 сутки - с **87,5%** до **26%***
- *в 30 сутки - с **57%** до **27%**.*

Не было увеличения смертности от СПОН среди пациентов, которым восполняли кровопотерю по этой схеме

(J. Duchesne и соавт., 2008;
J. Holcomb и соавт., 2006,2007, 2008;
M. Borgman и соавт., 2007)

Современные компоненты Damage Control Resuscitation при травме

- Допустимая гипотензия
- Рестриктивная инфузионная терапия
- Гемостатическая реанимация
- Температурный контроль и согревание
- Коррекция ацидоза
- Damage Control Surgery = хирургический контроль повреждений

✓ *H.M. A. Kaafarani, G. C. Velmahos. DAMAGE CONTROL RESUSCITATION IN TRAUMA. // Scandinavian Journal of Surgery 0: 1–8, 2014.*

Суть стратегии Damage control resuscitation сводится к изменению соотношения между СЗП и ЭМ до 1:1 или 1:1,5 и к раннему введению СЗП

Было доказано, что

- раннее введение СЗП увеличивает прокоагулянтную активность и антитромботический потенциал крови (P. Chowdhury и соавт., 2004; D. Bolliger и соавт., 2010; J. Roback и соавт., 2010)

- смесь из 1 единицы

ЭМ (250 мл)

СЗП (250 мл)

тромбомассы

имеет

Ht = 29%

к-во тромбоцитов

= 85·10⁹/мл

ПТИ= 62%

Это снижает риск коагуляционных нарушений и обеспечивает стабильный эффект

(K.Sihler, L. Napolitano, 2010; D. Shegovskikh и соавт., 2011)



Damage Control Surgery in the Era of Damage Control Resuscitation. C. M. Lamb, et al // Br J Anaesth. 2014;113(2):242-249.

Стратегия Damage Control состоит из 4-х фаз:

- (0) - распознавание пациентов, подлежащих DC и неотложная помощь: сосудистый доступ большого диаметра, торакальный дренаж при необходимости, быстрая последовательная индукция анестезии, интубация, начало согревания, транспортировка в операционную;
- (I) - немедленная лапаротомия с быстрой остановкой кровотечения и контролем загрязнения, временное закрытие раны;
- (II) – стабилизация физиологических и биохимических показателей в ОИТ. Целенаправленная ИТ позволяет получить эффект в течение 24-36 ч. Тщательное дообследование для выявления всех возможных повреждений;
- (III) - после ИТ, повторное хирургическое лечение для окончательного восстановления всех травм.

Рестриктивная ресусцитация и допустимая гипотония

Подразумевает использование меньшего объема инфузионной терапии, что

- (1) уменьшает частоту и тяжесть диллюционной коагулопатии;
- (2) предотвращает «вымывание» свежих сгустков, герметизирующих поврежденные сосуды;
- (3) уменьшает воспалительный каскад (SIRS, ARDS), который усугубляется в ответ на экзогенное введение жидкостей.

Борьба с гипотермией

- Важна температура инфузионных растворов и температура окружающей среды.
- *“Активное согревание”, “теплые растворы”.*

Crit Care Med. 2005 Jun;33(6):1296-301.

Admission hypothermia and outcome after major trauma.

Wang HE¹, Callaway CW, Peitzman AB, Tisherman SA.



При массивной кровопотере рекомендуется соотношение:

СЗП : ЭРИТРОЦИТЫ : ТРОМБОКОНЦЕНТРАТ

1 : 1 : 1 (1B)

Данное соотношение позволяет быстро обеспечивать восполнение факторов свертывания крови и тромбоцитов, без необходимости ожидать результатов проб коагуляции, в то время как развивается посттравматическая коагулопатия
(Napolitano L.M. et al. Clinical practice guidelines: Red blood cell transfusion in adult trauma and critical care // Critical Care Medicine. – 2009. – V. 37. – P. 3124-3157)

СЗП : ЭРИТРОЦИТЫ
минимум 1:2 (2C)

(Management of bleeding and coagulopathy following major trauma: An updated European guideline // Critical Care 2013, 17:R76.)

Особенности трансфузионной терапии боевой травмы

Таким образом, по отношению к общей потребности ОКБМ в компонентах и препаратах крови за 2014 г. у раненных было использовано:

- по компонентам крови – 17%;
- по препаратам 39,7%.

В целом поступившие раненные не требовали более высокого объема трансфузии аллогенной крови по сравнению с пациентами с гражданской политравмой, однако значительно больше была потребность в трансфузии криопреципитата и особенно в трансфузии раствора альбумина, поскольку из-за массивности повреждения мышечных массивов (при осколочных минно-взрывных ранениях) у всех пациентов имела место тяжелая критическая гипопроотеинемия и гипоальбуминемия, не корригируемая парентеральным и энтеральным питанием.

Профилактика и лечение острого повреждения почек при огнестрельной травме



- 1) Все поступившие пациенты с обширными ранами **должны расцениваться как имеющие рабдомиолиз** – динамика оценивается по уровню миоглобина крови;
- 2) Профилактика развития острого повреждения почек, включает **инфузионную терапию, ощелачивание**, при необходимости форсирование диуреза, хирургическую санацию ран;
- 3) При необходимости проведение продленной заместительной почечной терапии.

Current Opinion in
Critical Care



Optimal fluid resuscitation in trauma: type, timing, and total. M. Feinman, et al
// Curr Opin Crit Care 2014, 20:366–372.

- После того, как проблемы шока и кровотечения решены, акцент должен меняться от DCR к целенаправленной инфузионной терапии.
- Достижение и поддержание адекватной тканевой перфузии и оксигенации - цель целенаправленной стратегии реанимации.

Рестриктивна стратегія інфузій
Ліберальні стратегії ресусцитації
геморагічного шоку рідиною можуть
бути пов'язані з більш високою
смертністю у поранених.

Гіперволемія може бути така ж
небезпечна ніж гіповолемія, тому
вона припустима тільки в 1-й фазі

лікування шоку. Wang CH, et al. Liberal versus restricted fluid
resuscitation strategies in trauma patients: a systematic review and meta-
analysis of randomized controlled trials and observational studies. Crit Care
Med. 2014;42(4):954-61.

Немає доказів користі при збільшенні швидкості введення рідини, коли у пацієнтів, незважаючи на від'ємний баланс та незначні деякі клінічні ознаки гіповолемії, за умови нормальних АТ, ЧСС, диуреза, рівня лактата.
Не треба багато переливати при нормальному рівні АТ!

Brown JB, et al. J Trauma Acute Care Surg. 2013;74(5):1207-12.

Преимущества рестриктивной ИТ

- **Chappell D. и соавт. (2008)**


недифференцированная ИТ может увеличить капиллярную утечку. Использование **правильного вида жидкости в адекватных количествах в нужное время** может улучшить результаты лечения хирургических больных.

- **Bondgraad Nielsen M. и соавт. (2009)**

7 рандомизированных исследований (более **2000 б-х**) диапазон **либерального** интраоперационного режима от **2750 мл до 5388 мл** против **998-2740 мл** при **рестриктивном** режиме. В **5** работах обнаружили **уменьшение** количества **осложнений**, **сокращение сроков** пребывания в стационаре при **рестриктивном** типе ИТ.

Які розчини переливати?

C:\Users\rudych\Desktop\Waage Image Br 2008
004-klein.jpg



Незважаючи на деякі недоліки кристалоїдні розчини є основою інфузійної терапії шока. Найбільш часто використовують в нас 0,9% NaCl, але його інфузія > 2 – 3 л викликає гіперхлоремічний ацидоз, а розчин Рингера-лактата (РЛ) є гіпотонічним. Крім того, за останніми даними, 0,9% NaCl збільшує крововтрату порівняно з РЛ

Вітчизняні розчини для інфузій при крововтраті:

Юрія-Фарм: 0,9% р-н NaCl, р-н. Рингера лактату, ГЭК 200/0,5, реосорбілакт, Волютенз, (на сбалансованому розчині), Гекатон

Бажано: Збалансований кристалоїдний розчин, Гіпертонічний розчин, ГР + ГЕК

Вітчизняні розчини для інфузій при крововтраті:

Артеріум: 0,9% р-н NaCl, р-н Рингера, р-н Рингера лактату, ГЭК 200/0,5, ГЭК 130/0,4.

2. Інфузія: 0,9% р-р. NaCl , р-н. Рингера, р-н Рингера лактату, ГЕК 200/0,5.

3. Новофарм-Біосинтез: 0,9% р-н NaCl, р-н Рингера, р-н Рингера лактату, ГЭК 200/0,5).

4. Ніко. (0,9% р-р. NaCl, р-н Рингера, р-н Рингера лактату, ГЕК 200/0,5).

Для обеспечения **«объемного»** замещения дефицита ОЦК также применяют **растворы желатины** (Гелофузин, В. Braun или Волюнтез, Юрия-Фарм). Как правило, их **сочетают с ГЕКами** в соотношении **1:1** для уменьшения негативного влияния ГЕКов на коагуляцию или формирование сгустка.

Расчитать эмпирически степень кровопотери:

- перелом предплечья – 300 мл;
- перелом плеча - 400 мл;
- перелом голени – 600 мл;
- перелом бедра – 1500 мл;
- перелом костей таза – 2000 мл;
- гемоторакс – 1500–2000 мл;
- перелом одного ребра – 200–300 мл;
- травма живота – до 2000 мл;
- перелом таза+забрюшинная гематома–2000–4000мл;
- переломом позвоночника – 500–1500 мл;
- скальпированная рана размером с ладонь – 500 мл;
- лапаротомия – 500–1000 мл;
- торакотомия – 700–1000 мл;
- ампутация голени – 700–1000 мл;
- остеосинтез крупных костей – 500–1000 мл.

Массивное кровотечение:-

- Сист. АД < 90
- ЧСС > 100
- PH < 7.35
- BE < - 2
- Неконтролируемое активное кровотечение
- Слабый ответ на инфузию



!!! Активируйте протокол массивной трансфузии.

При предполагаемой массивной кровопотере мы немедленно активировали **протокол массивной трансфузии**.

- Срочно сдают в лабораторию кровь на обследование (группа крови и резус, гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, фибриноген, МНО, АЧТВ, газы крови и КЩС, лактат, электролиты).
- Начинают трансфузию 4-х доз одногруппной эритромаcсы и 4-х доз одногруппной СЗП.
- Если активное кровотечение продолжается, не дожидаясь результатов лабораторных анализов, показана повторная трансфузия 4-х доз одногруппной эритромаcсы и 4-х доз одногруппной СЗП с добавлением в терапию тромбоконцентрата.

Пакет для массивной трансфузии

Пакет №1

- 4 x O (1) отр / O (1) полож эритроцитов
- 4x СЗП

Пакет №2

- 4 x O (1) отр / O (1) полож или одногруппных эритроцитов
- 4x СЗП
- 1x пакет тромбоцитов



- При уровне фибриногена ниже 1 г/л показана трансфузия криопреципитата 5-10 доз.
- На фоне трансфузионной терапии необходим динамический лабораторный контроль пациента (общий анализ крови, тромбоциты, фибриноген, газы крови и КЩС, лактат).
- Дальнейший объем и состав инфузионно-трансфузионной терапии определяется индивидуально для каждого пациента в зависимости от объема кровопотери, реакции на проводимую терапию и динамики лабораторных показателей.
- Целесообразно привлечение специалиста по гемотрансфузиологии.

При ранениях крупных кровеносных сосудов и внутренних органов возможна **реинфузия** излившейся крови. Такую кровь необходимо собрать с помощью специальных аппаратов (Cell-Saver) или полимерных устройств для реинфузии.

Реинфузия крови в сосудистое русло пациента осуществляется через микропористые фильтры для реинфузии. Ввиду потенциальной возможности бактериального загрязнения в реинфузируемую аутокровь возможно добавление антибиотика широкого спектра действия.

Соотношение препаратов крови (боевая травма)

J Trauma. 2007 Oct;63(4):805-13.

The ratio of blood products transfused affects mortality in patients receiving massive transfusions at a combat support hospital.

Borgman MA¹, Spinella PC, Perkins JG, Grathwohl KW, Repine T, Beekley AC, Sebesta J, Jenkins D, Wade CE, Holcomb JB.

- Ретроспективное исследование 246 пациентов военных госпиталей

| СЗП : эритроциты | Общая летальность | Летальность от кровопотери |
|------------------|-------------------|----------------------------|
| 1:8 | 65% | 92.5% |
| 1:2.5 | 34% | 78% |
| 1:1.4 | 19% | 37% |

ВЫВОДЫ: У пациентов, требующих массивной трансфузии, высокое соотношение СЗП и эритроцитов (1:1.4) является независимым фактором улучшения выживаемости.


Протоколы массивной трансфузии должны использовать соотношение СЗП и эритроцитов 1:1 для всех пациентов, у которых имеется гипокоагуляция при травматических повреждениях.

Препараты крови vs свежая теплая кровь

Component Therapy vs Fresh Whole Blood



So Component Therapy Gives You
1U PRBC + 1U PLT + 1U FFP + 10 pk Cryo =
660 COLD mL
- Hct 29%
- Plt 87K
- Coag activity 65%
- 750 mg fibrinogen



Amund & Hess, Transfusion Med. Rev., 2003



[Crit Care Med.](#) 2008 Jul;36(7 Suppl):S340-5. Warm fresh whole blood transfusion for severe hemorrhage: U.S. military and potential civilian applications. [Spinella PC.](#)

У ПАЦИЕНТОВ С УГРОЖАЮЩИМ ЖИЗНИ КРОВОТЕЧЕНИЕМ И НЕОБХОДИМОСТЬЮ МАССИВНОЙ ТРАНСФУЗИИ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПОНЕНТНОЙ ТЕРАПИИ КОАГУЛОПАТИИ ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕЛИВАНИЯ **ТЕПЛОЙ СВЕЖЕЙ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ.**

НЕОБХОДИМЫ УСИЛИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ **БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕЛИВАНИЯ ТЕПЛОЙ СВЕЖЕЙ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ** В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

Management of bleeding and coagulopathy following major trauma: an updated European guideline

Donat R Spahn, Bertil Bouillon, Vladimir Cerny, Timothy J Coats, Jacques Duranteau, Enrique Fernández-Mondéjar, Daniela Filipescu, Beverley J Hunt, Radko Komadina, Giuseppe Nardi, Edmund Neugebauer, Yves Ozier, Louis Riddez, Arthur Schultz, Jean-Louis Vincent, Rolf Rossaint

Critical Care 2013, **17**:R76 (19 April 2013)

Инфузионная терапия, вазопрессоры, инотропы, температурный режим

Эритроциты. Рекомендуют целевой гемоглобин от 70 до 90 г/л. (1C)

Кристаллоиды применяют для начальной инфузии при травматическом кровотечении. (1B)

Коллоиды рекомендуют использовать в разумных пределах для конкретной ситуации. (1B)

Гипертонические растворы рекомендуют у гемодинамически нестабильных пациентов с проникающей травмой туловища. (2C)

Вазопрессоры рекомендуют для поддержания целевого АД при отсутствие ответа на инфузионную терапию. (2C)

Инотропы рекомендуют при дисфункции миокарда. (2C)

Управление температурой: рекомендуют раннее применение мер по снижению потерь тепла и поддержанию нормотермии. (1C)

Гипотермия до 33-35° С ≥48 ч применима у пациентов с ЧМТ при надежном контроле кровотечения. (2C)

ЧТО У НАС?

Пошаговая стратегия волеической ресусцитаии при травматическом шоке

При АДсист. < 80 мм рт. ст. :

Шаг 1. Быстрая инфузия 500 мл кристаллоида и 500 мл ГЭК. В случае стабилизации гемодинамики - АДсист. > 80 мм рт. ст. дальнейший темп и состав инфузионной терапии по показаниям.

При выраженной гипотензии в качестве альтернативы возможно введение 250 мл гипертонического раствора «HyperNaes».

Шаг 2. В случае если сохраняется АДсист. < 80 мм рт. ст. – дополнительное введение 500 мл коллоида и 500 мл кристаллоида под давлением. В случае стабилизации гемодинамики - АДсист. > 80 мм рт. ст. дальнейший темп и состав инфузионной терапии по показаниям.

Шаг 3. При сохранении АДсист. < 80 мм рт. ст. – подключение вазопрессорной поддержки.

Вазопрессорная поддержка - при рефрактерной гипотензии, не отвечающей на восполнение объема циркулирующей крови:

- Норадrenalин 1-2 мкг/кг/мин.;
- Дофамин 2,5-20 мкг/кг/мин.

Emergency War Surgery Невідкладна Військова Хірургія
Fourth United States Revision (2013)

Мікроорганізми, що зумовлюють інфекцію на полі бою:

- Грампозитивні коки: стафілококи; стрептококи; ентерококи.
- Грамнегативні палички: Escherichia coli, Proteus, Klebsiella

Pseudomonas, Enterobacter, Acinetobacter, Serratia є поширеними нозокоміальними патогенами, інфікування якими переважно відбувається у поранених, які госпіталізовані на тривалий період часу, однак не в поранених, доставлених безпосередньо з поля бою.

Emergency War Surgery Невідкладна Військова Хірургія
Fourth United States Revision (2013)

Лікування. Загальні принципи:

- Хірургічне лікування і антибіотики необхідно застосувати якомога швидше, в ідеалі — у межах 3 годин з моменту поранення.
- Оптимально хірургічну обробку рани потрібно виконати в межах 6 годин з моменту поранення.
- Рани треба рясно промити фізіологічним розчином або стерильною водою, щоб звести до мінімуму ризик забруднення рани.
- Антибіотики потрібно застосувати якомога швидше після поранення, і продовжувати протягом 24 годин залежно від розміру, ступеня пошкодження тканин і забруднення рани.

Варто пам'ятати!!!

- Правило «золотого часу» - допомога має надаватись в перші 2-3 год, бо далі смертність збільшується в геометричній прогресії.
- В\в доступ якомога раніше (солдатом, сан. інструктором, фельдшером, лікарем)
- Початок інфузійної терапії розпочати там, де безпечно!! (якомога раніше)
- Правильно і швидко вміти всім накладати джгути - по принципу «закрити» кран.
- Хірургічні втручання(ПХО) в об'ємі : зупинка кровотечі , широке розкриття ран (без накладання швів!!), некректомія.
- Оперативні втручання – якомога раніше !!! (При політравмі пріоритет в сортуванні (коли? що? яка послідовність?) має віддаватись анестезіологу.)
- Своєчасний первинний остеосинтез – є протишоковою терапією. Має бути повноцінна ПХО з максимальним видаленням частинок і великих кісткових уламків з рани.
- При компартмент синдромі – обмежити в\в інфузію та виконати декомпресійну фасціотомію з адекватним дрениванням рани.

- Визначити дефіцит ОЦК , гемоглобін, гематокрит, еритроцити, (ЦВТ).
(Але забір крові має бути обов'язково з вени!!, а не з пальця).
Визначення Серцевого викиду – при можливості !!
- Існує невідповідність між ОЦК і клінікою шока!! (хворий може сам вийти з поля бою , сісти тихенько і померти). Проводити тести на скриту гіповолемію (Сафара, ..)
- Треба мати запас теплих розчинів (37° С) і зігріваючі засоби.
- Гемастатики вводити тільки за показами!!

Транексамову кислоту , препарати Кальція. Інші - можуть зашкодити.

- При Синдромі тривалого стиснення – олужнення крові!! і контрольована Інфузійна терапія.
- Інфузійна терапія :
 - *Кристаллоїди:* фізіологічний і гіпертонічний розчини, Рінгер, Хартмана;
 - *ГЕКи:* гекотон, гекодез, стерофундін, ..
 - *Желатіни:* волютенз, гелофузін, ..
 - *Реосорбілакт*
 - *Альбумін – бажано 20-40%.*

➤ При розвитку геморагічного шоку – краще застосовувати Рінгера ацетат, а не лактат.

➤ Дози інфзійних розчинів :

- Кристалоїди – 7 мл/кг (до 10 мл/кг) ;
- колоїди - 5 мл/кг (до 10 мл/кг);
- краще ГЕК:ЖЕЛ=1:1, (але ГЕКи - не більше 800мл/д);
- Реосорбілакт до 10 мл/кг.

➤ Дози вазопресорів (в стадії декомпенсації) - високі!!

Краще норадреналін(але його не має), тому коктейль

(дофамін 20-30мл + мезатон 20-30мл + фіз..розчин 200 мл)

➤ Препарати крові: ПСЗ : ЕМ :ТК = 1 : 1 : 1 , (+кріопреципітат, фібриноген)

➤ для діагностики коагуляційної здатності крові – застосовувати апарат низькочастотної п'езотромбоеластограми АРП-01М (Одеса, проф. Тарабрін О.А.).

➤ Олужнення і рання стимуляція діурезу!!

➤ Рання антибіотико-профілактика !!!

➤ Раннє харчування!!!



Дякую за увагу !