



**Кисневий дисбаланс
при перитонітах:
програми
інфузійної терапії**

Кисневе забезпечення організму при перитоніті



Метаболізм кисню при різних фазах перитоніту



ГЕКОДЕ

З

Гідроксиетилкрохмалу (200 000)
– 60,0 г

Натрію хлориду – 9,0 г

Води для ін'єкцій – до 1000 мл

Осмолярність – 308 мосм/л

Випускають:

по 200 та 400 мл Гекодезу
в скляних флаконах



СОРБІЛАКТ

сорбітол – 200 г,
розчин натрію лактату 7% - 270,3 мл
натрію хлориду – 6 г,
кальцію хлориду – 0,1 г,
калію хлориду – 0,3 г,
магнію хлориду – 0,2 г,
води для ін'єкцій – до 1 л.

Осмолярність – 1670 мосм/л

Форма випуску:

флакони по 200 та 400 мл Сорбілакту®
в скляних флаконах ємністю
250 і 500 мл



РЕОСОРБІЛАКТ

сорбітол – 60 г,

Р-н натрію лактату 7% - 270,3 мл

натрію хлориду – 6 г,

кальцію хлориду – 0,1 г,

калію хлориду – 0,3 г,

магнію хлориду – 0,2 г,

води для ін'єкцій – до 1 л.

Осмолярність – 900 мосм/л

Форма випуску:

флакони по 200 та 400 мл



ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ЮРІЯ-ФАРМ

ЛАТРЕН

(пентоксифілін, 50 мг в 100 мл)

Механізм дії:

покращення мікроциркуляції і
реологічних властивостей крові:

- зниження агрегації еритроцитів і тромбоцитів;
- підвищення еластичності еритроцитів;
- нормалізація функції ендотелію

Випускають по 100,200, 400 мл у флаконах

ЮРІЯ-ФАРМ



комплексный препарат
с усиленным
микроциркуляторным
действием

- системная вазодилатация
- нормализация электролитного
состава плазмы крови
- готовая лекарственная форма

ЛАТРЕН®

- улучшение микроциркуляции и
реологических свойств крови:
 - снижение агрегации эритроцитов
и тромбоцитов;
 - увеличение эластичности
эритроцитов;
 - нормализация функции
эндотелия



Вдохнём новую жизнь...

Ксилат

100 мл розчину містить:

ксиліту – 5,0 г

натрію ацетату – 0,26 г

натрію хлориду – 0,6 г

кальцію хлориду – 0,01 г,

калію хлориду – 0,03 г,

магнію хлориду – 0,02 г,

Енергетична цінність – 200 ккал/л

Осмолярність – 610 мосм/л

Випускають:

по 200 та 400 мл Ксилату

в скляних флаконах



ЮРІЯ-ФАРМ

ГІК

Калію хлориду – 5,0 г

Глюкози – 50,0 г

Води для ін'єкцій – до 1 літра

Калій-іон – 67,06 ммоль/л

Хлорид-іон – 67,06 ммоль/л

Осмолярність - 412 мосм/л

Випускають у флаконах по 200 мл



ЮРІЯ-ФАРМ

Україна, 03680, м. Київ, вул. М.Амосова, 10
ТОВ "Юрія-Фарм", т./ф. (044) 275-92-42.

ГіК розчин для інфузій

GiK, solutio pro infusionibus

200 мл

Склад:

Калію хлориду - 5,0г
Глюкози (у перерахунку на безводну)-50,0г
Води для ін'єкцій до 1л

Іонний склад препарату:

	г/л	Ммоль/л
Калій-іон	2,622	67,06
Хлорид-іон	2,377	67,06

СТЕРИЛЬНО • АПІРОГЕННО

Теоретична осмолярність – 412 мОсм/л

Вводити внутрішньовенно крапельно

Застосовувати за призначенням лікаря

Серія

Придатний до

Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі від +5°C до +25°C



ЮРІЯ-ФАРМ

ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА РЕАКТИВНИЙ ПЕРИТОНІТ (схема)

Доопераційна підготовка: тривалість – 1 год

Об'єм інфузій – 14 мл/кг (1000 мл)

- реосорбілакту – 200 мл,
- р-н Рінгера – 400 мл,
- р-н ксилату – 200 мл,
- р-н ГІКу – 200 мл

Під час операції – інфузії кристалоїдів

Післяопераційна терапія:

Об'єм інфузій – 40 мл/кг (2800 мл)

р-н реосорбілакту	1	(200)
р-н Рінгера	4	(800)
р-н ксилату	2	(400)
р-н ГІКу	3	(600)
р-н латрену	1	(200)
р-ни парент. харчування	3	(600)

ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА ТОКСИЧНИЙ ПЕРИТОНІТ (схема)

Доопераційна підготовка: тривалість – 2 год

Об'єм інфузій – 20 мл/кг

(1500 мл)

р-н гекодезу	- 2	(400)
р-н сорбілакту	– 2	(400)
р-н Рінгера	– 2	(400)
р-н ксилату	– 1	(200)
р-н ГІКу	– 2	(400)

Терапія під час операції та в післяопераційному періоді:

Об'єм інфузій – 50 мл/кг

(3500 мл)

р-н гекодезу	2	(400)
р-н реосорбілакту	2	(400)
р-н Рінгера	5	(1000)
р-н ксилату	2	(400)
р-н латрену	1	(200)
р-н ГІКу	2	(400)
р-ни парент. харчування	4	(800)

ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА ТЕРМІНАЛЬНИЙ ПЕРИТОНІТ (схема)

Доопераційна підготовка: тривалість – до 3 год (2 вени)

Об'єм інфузій – 40 мл/кг (2800 мл)

р-н гекодезу	- 2	(400)	(гекодез + 7,5 % р-н натрію хлориду)
р-н сорбілакту	- 2	(400)	
р-н Рінгера	- 5	(1000)	
р-н ксилату	- 2	(400)	
р-н ГІКу	- 3	(600)	

Терапія під час операції та в післяопераційному періоді:

Об'єм інфузій – 70 мл/кг (5000 мл)

р-н гекодезу	4	(800)
р-н реосорбілакту	3	(600)
р-н Рінгера	5	(1000)
р-н ксилату	2	(400)
р-н ГІКу	3	(600)
білкові препарати, компоненти крові	2	(400)
р-ни для парент. харчування	6	(1200)

Критерії адекватності інфузійної терапії

нормалізація:

- системної гемодинаміки (ЦВТ, САТ, ЧСС, ХОС),
- мікроциркуляції,
- органних функцій,
- метаболічних процесів у тканинах

забезпечення:

- транспортування кисню до клітин > 400 мл/хв/м²,
- споживання кисню клітинами > 140 мл/хв/м²

A scenic photograph of a waterfall cascading over rocks in a forest. The water is white and frothy as it falls. In the foreground, a large, dark, fallen log lies across the stream. The surrounding area is lush with green trees and foliage. The overall atmosphere is serene and natural.

***Дякую
за увагу***